

מודעות מצילה חיים!

זיהוי תגובה אלרגית למזון:

תגובה אלרגית יכולה להתחיל תוך שניות ספורות מהחשיפה לאלרגן, ניתן לזהותה ע"י התסמינים הבאים:

תגובות קלות:



אף:
גרד, עיטושים,
נזלת מימית



עור:
פריחה
גרד קל



פה:
גרד ונפיחות
בשפתיים,
בלשון או בפה



דרכי עיכול:
בחילה קלה,
חוסר נוחות

לטיפול במערכת גוף אחת, טיפול באנטיהיסטמין יש להישאר בהשגחה צמודה. יש לעבור לטיפול באפיפן

תגובות קשות:



עור:
פריחה מופשטת,
אודם מופשט,
נפיחות בגפיים



פה:
נפיחות רצינית
בשפתיים, בלשון
או בפה



ריאות:
קוצר נשימה,
שיעול,
צפצופים



לב:
דופק חלש,
ערפול הכרה,
התעלפות,
חיוורון, הכחלה



דרכי עיכול:
בחילה,
כאב בטן עזיז,
הקאה, שלשול



לוע*:
תחושת צריבה
או מלאות בלוע,
צרידות, כחכוך




תופעות שונות:
התגובה מחמירה,
תחושה לא טובה
או מופיעים סימנים
במספר מערכות

הזרק אפיפן מיד!


חומרת התסמינים ועורב המערכות יכולות להתשנות במהירות, כל התסמינים המסומנים ב-* עלולים להתפתח לתגובה מסכנת חיים.

טיפול בתגובה אלרגית:

אפינפרין (מזרק אפיפן) הוא תכשיר מציל חיים לטיפול במקרה של תגובה אלרגית חמורה (תגובה אנפילקטית), תגובה המערבת 2 מערכות גוף או תגובה נשימתית - במקרה זה יש להזריק באופן מיידי בהתאם להוראות:




1 הסרת הנצרה הכחולה



2 קרוב הקצה הכתום לחלק החיצוני של הירך



3 נעיצת המזרק והחזקתו במשך 3 שניות



4 הוצאת המזרק ועיסוי האזור



התקשר 101 והזמן ניידת טיפול נמרץ (נט"ן)

במידה ואין שיפור לאחר 5 דקות, יש לתת מנה נוספת של אפינפרין!